

COMPLÉMENT À L'ARTICLE "SUR UNE INÉGALITÉ ÉLÉMENTAIRE
 OÙ INTERVIENNENT DES FONCTIONS TRIGONOMETRIQUES"

D. S. Mitrinović et D. D. Adamović

0. Dans l'article [1], nous avons étudié la validité de l'inégalité

$$(1) \quad (\cos x)^c < \frac{(\sin x)^a}{x^b} \quad (a, b, c \text{ nombres réels})$$

pour $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Partant de la remarque que:

(R) pour $b \neq 0$ l'inégalité (1) équivaut à

$$f(x) = x - (\sin x)^p (\cos x)^q < 0 \quad \left(p = \frac{a}{b}, q = -\frac{c}{b}\right)$$

ou à $f(x) > 0$ suivant que l'on a $b > 0$ ou $b < 0$, on y a établi une proposition sur le signe de $f(x)$ $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$ dans tous les cas possibles (proposition 3 dans [1]). On a cependant omis, dans l'article [1], de formuler explicitement une proposition qui résumerait, d'une manière directe, la discussion complète de l'inégalité (1), c'est-à-dire la discussion complète du signe de la fonction

$$g(x) = (\cos x)^c - \frac{(\sin x)^a}{x^b} \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right),$$

y compris le cas $b = 0$ (d'ailleurs facile à étudier). C'est cet énoncé final que nous donnons dans cette note.

Désignons, dans ce qui suit, par $\boxed{-}$ le fait que l'on a $g(x) < 0$ $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, par $\boxed{-0+}$ le fait que l'on a $g(x) < 0$ $(0 < x < x_1)$, $g(x_1) = 0$, $g(x) > 0$ $\left(x_1 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, et employons les symboles correspondants pour les autres cas qui auront lieu.

0.1. En ce qui concerne le signe de

$$g(x) = (\cos x)^c - (\sin x)^a \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right),$$

c'est-à-dire le cas $b = 0$, on remarque tout d'abord que l'on a, sous l'hypothèse $a^2 + c^2 > 0$, $\boxed{-}$ et $\boxed{+}$ dans les cas $c \geq 0, a \leq 0$ et $c \leq 0, a \geq 0$ respectivement. Dans le cas $a > 0, c > 0$, on a: $g(x) \downarrow \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, $g(0) = 1$, $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$ et par

conséquent $\overline{+0-}$. Enfin, dans le cas $a < 0$, $c < 0$, on a: $g(x) \uparrow \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, $g(+0) = -\infty$, $g\left(\frac{\pi}{2}-0\right) = +\infty$ et par conséquent $\overline{-0+}$.

1. Soit $\lambda(p)$ la fonction réelle mentionnée dans l'énoncé de la proposition 3 dans [1]. Rappelons qu'elle est définie, continue et strictement décroissante de la valeur 0 jusqu'à la valeur $-\frac{1}{3}$ dans l'intervalle $(-\infty, 1)$.

La proposition 3 de [1], combinée à la remarque (R), et le résultat 0.1 conduisent immédiatement à la proposition suivante sur le signe de $g(x)$:

Proposition. On a:

$\overline{-}$ si et seulement si: $\alpha) a \leq b \leq 0 \leq c$, $a^2 + b^2 + c^2 > 0$, ou $\beta) a > b$, $c > -\lambda\left(\frac{a}{b}\right)b > 0$, ou $\gamma) 0 < a < b < 3c$;

$\overline{+}$ si et seulement si: $\alpha) a \geq b \geq 0 \geq c$, $a^2 + b^2 + c^2 > 0$, ou $\beta) a > b$, $c < -\lambda\left(\frac{a}{b}\right)b < 0$, ou $\gamma) 3c < a < b < 0$;

$\overline{-0+}$ si et seulement si: $\alpha) a < b \leq 0$, $c < 0$, ou $\beta) b > \max\{a, 0\}$, $c \leq 0$, ou $\gamma) a = b < 3c < 0$;

$\overline{+0-}$ si et seulement si: $\alpha) a > b \geq 0$, $c > 0$, ou $\beta) b < \min\{a, 0\}$, $c \geq 0$, ou $\gamma) 0 < 3c < a = b$;

$\overline{-0+0-}$ si et seulement si: $a < b$, $0 < c < -\lambda\left(\frac{a}{b}\right)b$;

$\overline{+0-0+}$ si et seulement si: $a > b$, $0 > c > -\lambda\left(\frac{a}{b}\right)b$;

$\overline{-0-}$ si et seulement si: $b < \min\{a, 0\}$, $c = -\lambda\left(\frac{a}{b}\right)b$;

$\overline{+0+}$ si et seulement si: $b > \max\{a, 0\}$, $c = -\lambda\left(\frac{a}{b}\right)b$;

$\overline{0}$ $\left(g(x) = 0 \text{ pour } 0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$ si et seulement si: $a = b = c = 0$.

BIBLIOGRAPHIE

[1] D. S. Mitrinović et D. D. Adamović *Sur une inégalité élémentaire où interviennent des fonctions trigonométriques*, Ces Publications, № 143—155 (1965), p. 23—34.